



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DEP 08 11 20018062

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 4 du 21 Avril 1999

Rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

POIS

Ces cultures ne présentent pas de problèmes sanitaires pour l'instant; aucune maladie n'est visible sauf quelques symptômes de bactérioses; les pucerons sont rares.

N'hésitez pas à intervenir en cas de présence; il faut stopper cette maladie épidémique le plus tôt possible.

Vous pouvez utiliser Horizon, Païndor, Opus, Capitole aux doses homologuées

COLZA

La plupart des parcelles sont au stade G3-G4 (longueur des siliques > 4cm - siliques bosselées); sur les cultures non protégées en bordure comme cela avait été préconisé, les colonies de **Pucerons** se trouvent réparties sur l'ensemble de la parcelle; on observe encore également beaucoup de **Charançons des siliques**

Pour une priorité pucerons préférez une spécialité contenant du Pyrimicarbe:

BEST 1.25 L/Ha

KARATE K 1 L

Pour une optique Charançons seuls vous pouvez utiliser également:

BAYTHROID 0.2 L

DECIS micro 0.08 Kg

KARATE Xpress 0.1 L

BLE DUR

Oïdium: très présent sur l'ensemble des parcelles quel que soit le stade mais variable selon les variétés; les plus touchées sont Brindur; Acalou est concerné pour les stades les plus avancés; Néfer est indemne

Septoriose: visible sur les feuilles inférieures mais peu développée; par contre nos collègues de Midi-Pyrénées la signalent de façon plus importante en sols limoneux; reportez vous à leurs conseils si vos parcelles sont dans ces secteurs

Rouille jaune: absente pour l'instant; n'hésitez pas à nous signaler la présence de foyers.

Rouille brune: présente surtout sur les semis précoces (dernière décade d'Octobre) et sur variétés sensibles comme Brindur jusqu'à la F3; pour les autres semis (10 à 20 Novembre) on observe quelques rares pustules à la base des plantes

Aux stades actuels l'oïdium seul ne justifie pas de traitement

Par contre pour les semis précoces et variétés sensibles type Brindur une intervention peut être réalisée sur F1 enroulée avec une strobilurine visant l'ensemble des maladies des feuilles.

AMISTAR PRO 2L/Ha

OGAM 1 L

Sinon attendez que la F1 soit étalée pour une intervention classique que nous vous précisons bientôt; il en est de même pour les autres semis.

►
POIS: pas de traitement

►
COLZA:
Pucerons cendrés et/ou
Charançons des siliques:
Intervenez dès lors que vous notez en moyenne 1 Charançon pour 2 plantes et/ou 2 colonies de Pucerons par m².
Pas de fongicides

►
CEREALES:
Blés durs
Oïdium+Rouille
*** variétés sensibles**
*** semis précoces**
stade F1 enroulée
intervention avec strobilurine

Attendre pour les autres

Blés tendres
Attention à la Rouille jaune
traitez si présence

BLE TENDRE

Nous avons trouvé des foyers de **Rouille Jaune** sur VITO dans nos parcelles expérimentales.

Surveillez bien vos cultures, en cas de doutes consultez votre technicien

DRAF
Service Régional de la
protection des
Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER
CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de Languedoc
Roussillon
Directeur gérant:
M.FREYDIER
Publication périodique
C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582